

<予防接種一覧表（令和8年4月1日現在）> 標準的な接種期間と、同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

種類		接種回数	予診票配布時期	対象年齢	(年齢) 0歳	2か月	3か月	4か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	～				
定期予防接種	ロタウイルス	ロタリックス	2回	予診票配布時期	生後6週から24週まで	27日以上あける	①.....②	1回目※	2回目																
		または ロタテック	3回		生後6週から32週まで	27日以上あける	27日以上あける	①.....②.....③	1回目※	2回目	3回目														
	ヒブ (Hib)		4回		生後2月から生後60日に至るまでの者	(接種開始 生後2月～7月※)	27日以上あける	27日以上あける	7か月以上あける	①.....②.....③.....④	初回1回目	2回目	3回目											追加(4回目)	
	小児の肺炎球菌 (7価ペナ-20・バクテリックス15)		4回		生後2月から生後60日に至るまでの者	(接種開始 生後2月～7月※)	27日以上あける	27日以上あける	初回接種終了後60日以上かつ生後12月に至った日以降	①.....②.....③.....④	初回1回目	2回目	3回目												追加(4回目)
	B型肝炎		3回		生後1歳に至るまでの間にいる者	(接種開始 生後2月～9月)	27日以上あける	139日以上あける		①.....②.....③	初回1回目	2回目													追加(3回目)
	5種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風 不活化ポリオ・ヒブ)		4回		生後2月から生後90日に至るまでの者	(接種開始 生後2月～)	20日以上あける	20日以上あける	6か月以上あける	①.....②.....③.....④	1期 初回1回目	2回目	3回目												1期追加(4回目)
	結核 (BCG)		1回		生後1歳に至るまでの間にいる者	(標準的な接種期間は生後5月～8月)				①															
	麻しん風しん (MR)		2回		1期：1歳頃に郵送 2期：年長時に郵送	1期：生後12月から生後24月に至るまでの間にいる者 2期：5歳以上7歳未満の者であって、小学校入学前の1年間にある者					① 1期														② 2期
	水痘		2回		1歳頃に郵送	生後12月から生後36月に至るまでの間にいる者					3か月以上あける ①.....②														1回目 2回目
	日本脳炎		4回		1期：3歳頃に郵送 2期：小4で配布	1期：生後6月から生後90月に至るまでの間にいる者 2期：9歳以上13歳未満の者								(3歳～)	(4歳～)				(9歳～13歳未満)						6日以上あける 6か月以上あける ①.....②.....③ 1期初回1回目 2回目 1期追加(3回目)
2種混合		1回	小6で配布	11歳以上13歳未満の者																			(11歳～13歳未満) 小6 ① 2期		
ヒトパピローマウイルス (HPV)	シルガード9 (9価)		中1で配布 (女子のみ)	12歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる日の属する年度の末日までの間にいる女子																			※接種回数や接種間隔等は、冊子「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。		

ロタウイルスワクチンには2種類あり、2回接種を受けるもの（ロタリックス）と、3回接種を受けるもの（ロタテック）があります。どちらか1種類、同じワクチンで決められた回数の接種をしましょう。

※1回目の接種を生後2月から生後14週6日までに受けてください。生後15週以降の接種はおすすめしていません。

※ヒブ、小児の肺炎球菌で接種開始年齢が生後7月を超えてしまった場合などの接種方法につきましては、冊子「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。

小学校入学前の1年間