

< 予防接種一覧表 (令和2年10月1日現在) > ★標準的な接種期間と、同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

	種類	接種回数	予診票配布時期	対象年齢	(年齢)								
					0歳	2か月	3か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳
定期予防接種	ロタ	ロタリックス	2回	生後6週から24週まで	27日以上あける ①.....② 1回目※ 2回目								
		または ロタテック	3回		27日以上 27日以上あける あける ①.....②.....③ 1回目※ 2回目 3回目								
	ヒブ (Hib)		4回	生後2月から生後60月に至るまでの者	(接種開始 生後2月~7月※) 27日以上 27日以上 7か月以上あける ①.....②.....③.....④ 初回1回目 2回目 3回目 追加(4回目)								
	小児用肺炎球菌		4回	生後2月から生後60月に至るまでの者	(接種開始 生後2月~7月※) 27日以上 27日以上 60日以上あけ、生後12月に至った日以降で ①.....②.....③.....④ 初回1回目 2回目 3回目 追加(4回目)								
	B型肝炎		3回	生後1歳に至るまでの間にある者	(接種開始 生後2月~9月) 27日以上 139日以上あける あける ①.....②.....③ 初回1回目 2回目 追加(3回目)								
	4種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ)		4回	生後3月から生後90月に至るまでの者	(接種開始 生後3月~) 20日以上 20日以上 6か月以上あける あける あける ①.....②.....③.....④ 1期 初回1回目 2回目 3回目 1期追加(4回目)								
	BCG		1回	生後1歳に至るまでの間にある者	(標準的な接種期間は生後5月~8月) ①								
	麻しん風しん (MR)		2回	1期：1歳頃に郵送 2期：年長時に郵送	1期：生後12月から生後24月に至るまでの間にある者				①				
	水痘		2回	1歳頃に郵送	生後12月から生後36月に至るまでの間にある者				3月以上あける ①.....②				
	日本脳炎		4回	1期：3歳頃に郵送 2期：小4で配布	1期：生後6月から生後90月に至るまでの間にある者				(3歳~) (4歳~) (9歳~13歳未満)			小4	
				2期：9歳以上13歳未満の者				6日以上 6か月以上あける あける ①.....②.....③ 1期初回1回目 2回目 1期追加(3回目)			④ 2期(4回目)		

★ロタの定期接種対象者は、2020年8月1日以降に生まれた乳児です。  
★ロタウイルスワクチンには2種類あり、同様の効果があります。  
2回接種を受けるもの(ロタリックス)と、3回接種を受けるもの(ロタテック)があります。  
どちらか1種類、同じワクチンで、決められた回数の接種をしましょう。  
※1回目の接種を生後2月から生後14週6日までに受けてください。  
生後15週以降の接種はおすすめしていません。

小学校入学前の1年間

※ヒブ、小児用肺炎球菌で接種開始年齢が生後7月を超えてしまった場合などの接種方法につきましては、冊子「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。