

< 予防接種一覧表 > 標準的な接種期間と、同じ種類のワクチンを接種する場合の間隔

種類	接種回数	予診票配布時期	対象年齢	(年齢)																			
				2か月	3か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	11歳	12歳	～						
ロタ	ロタリックス	2回	生後6週から24週まで	27日以上 あける ①.....② 1回目※ 2回目	ロタウイルスワクチンには2種類あり、2回接種を受けるもの(ロタリックス)と、3回接種を受けるもの(ロタテック)があります。 どちらか1種類、同じワクチンで決められた回数の接種をしましょう。 ※1回目の接種を生後2月から生後14週6日までに受けてください。 生後15週以降の接種はおすすめしていません。																		
	または ロタテック	3回	生後6週から32週まで	27日以上 27日以上 あける あける ①.....②.....③ 1回目※ 2回目 3回目																			
ヒブ (Hib)	4回		生後2月から生後60月に至るまでの者	(接種開始 生後2月～7月※) 27日以上 27日以上 7か月以上 あける あける あける ①.....②.....③.....④ 初回1回目 2回目 3回目 追加(4回目)	※ヒブ、小児用肺炎球菌で接種開始年齢が生後7月を超えてしまった場合などの接種方法につきましては、冊子「予防接種と子どもの健康」をご確認ください。																		
小児の肺炎球菌	4回		生後2月から生後60月に至るまでの者	(接種開始 生後2月～7月※) 27日以上 27日以上 60日以上あけ、生後12月に至った日以降 あける あける ①.....②.....③.....④ 初回1回目 2回目 3回目 追加(4回目)																			
B型肝炎	3回		生後1歳に至るまでの間にある者	(接種開始 生後2月～9月) 27日以上 139日以上 あける あける ①.....②.....③ 初回1回目 2回目 追加(3回目)																			
4種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 不活化ポリオ)	4回		生後3月から生後90月に至るまでの者	(接種開始 生後3月～) 20日以上 20日以上 6か月以上 あける あける あける ①.....②.....③.....④ 1期 初回1回目 2回目 3回目 1期追加(4回)																			
結核(BCG)	1回		生後1歳に至るまでの間にある者	(標準的な接種期間は生後5月～8月) ①																			
麻しん風しん(MR)	2回	1期：1歳頃に郵送 2期：年長時に郵送	1期：生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2期：5歳以上7歳未満の者であって、小学校入学前の1年間にある者	① 1期	小学校入学前の1年間						② 2期												
水痘	2回	1歳頃に郵送	生後12月から生後36月に至るまでの間にある者	3か月以上あける ①.....② 1回目 2回目																			
日本脳炎	4回	1期：3歳頃に郵送 2期：小4で配布	1期：生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 2期：9歳以上13歳未満の者	(3歳～) (4歳～) (9歳～13歳未満)			6日以上 あける ①.....②.....③ 1期 初回1回目 2回目 1期追加(3回目)	6か月以上 あける ④ 2期															
2種混合	1回	小6で配布	11歳以上13歳未満の者				(11歳～13歳未満)			小6 ① 2期													
ヒトパ ウイ ルス (HPV)	サーバリックス (2冊) または カータシル (4冊)	3回	中1で郵送(女子のみ)	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子  ヒトパピローウイルス感染症ワクチンには2種類あります。 どちらか1種類、同じワクチンで決められた回数の接種をしましょう。	(12歳となる年度の初日～16歳となる年度の末日)						1か月以上あける ①.....②.....③ 1回目 2回目 3回目	2回目から2か月半以上かつ1回目から5か月以上あける ①.....②.....③ 1回目 2回目 3回目											
												・半年～1年の間に3回接種。 ・使用薬剤により接種間隔が異なるため、医療機関へ確認をしてください。											